

Gingivit[®] NF

Nueva Fórmula
PREVIENE la inflamación y el **sangrado de encías**

Composición:

Cada 100 g contiene:

Sodio monofluor fosfato (MFP) (equivalente a 1450 ppm de flúor)	1,10 g
Cloruro de cetilpiridinio	0,05 g
Excipientes c.s.p.	100,00 g

Excipientes: Aceite de Menta Optamint, Metil Cocoyl Taurato de Sodio, Fosfato Dibásico de Calcio Anhidro, Fosfato Dibásico de Calcio Dihidrato, Colorante Azul N° 1 Cl 42090, Glicerina, Hidroxietilcelulosa, Metil parabeno, Mezcla Sabor Herbal, Estearato de Polioxilo 40, Propil parabeno, Dióxido de Silicio Coloidal, Sodio Sacarina, Sorbitol, Tetrasodio pirofosfato, Dióxido de Titanio, Zinc Lactato, Agua Purificada.

Acción Farmacológica: Las encías, debido a varias causas pueden presentar síntomas agudos o crónicos de debilidad, tales como tumefacción, porosidad y sangrado frecuente. **Gingivit[®] NF** es una pasta dental especialmente formulada para combatir todos estos síntomas. Su exclusiva fórmula contiene Cloruro de Cetilpiridinio, una sustancia antiséptica que ha demostrado eficacia como reductor de placa bacteriana y en el manejo de la Gingivitis. También **Gingivit[®] NF** posee una acción astringente, la cual va acompañada de contracción y estabilización del endotelio capilar, de modo que la trasudación de las proteínas se detiene, por lo tanto el edema en las encías desaparece y el proceso inflamatorio se detiene.

Gingivit[®] NF contiene la cantidad justa de Sodio monofluor fosfato para fortalecer rápida y efectivamente el esmalte dental contra la acción de los ácidos que provocan las caries.

Gingivit[®] NF fue desarrollada para ser usada diariamente, en lugar de su pasta dental común, pues tiene un gran poder limpiador que deja los dientes relucientes y un agradable sabor a menta.

Indicaciones: Tratamiento de inflamaciones agudas y crónicas de la mucosa gingival. Gingivitis. Gingivo-estomatitis. Piorrea alveolar.

Instrucciones de uso:

- Aplicar **Gingivit[®] NF** en un cepillo dental de filamentos suaves (tipo soft).
- Cepillarse los dientes siguiendo las normas de cepillado dadas por el Odontólogo y masajeando la encía.
- La frecuencia recomendada es un cepillado en la mañana y otro en la noche, después de las comidas o como el Odontólogo indique.

Modo de Empleo: Cepillado diario 3 veces al día, después de cada comida principal, en lugar de su pasta dental habitual.

Recomendaciones: Es muy importante que el paciente se haga en el consultorio dental una limpieza a fondo o profilaxis dental, por lo menos 2 veces al año. La acumulación de placa bacteriana causa inflamación gingival crónica y sangrado permanente y progresivo, que no se cura de otra manera.

Interacciones: Ninguna.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

Precauciones: Ninguna.

Incompatibilidades: No reportadas.

Reacciones Adversas: No reportadas.

Advertencias: Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños. No aplicar sobre la piel y no tragarse. Si se interrumpe la rutina del tratamiento, los efectos beneficiosos del uso de **Gingivit[®] NF** pueden detenerse.

Advertencias Especiales:

Uso en Embarazo: El uso de **Gingivit[®] NF** está indicado durante el periodo de embarazo, pues es coadyuvante en el control de la gingivitis del embarazo. Del mismo modo puede utilizarse en el periodo de lactancia. Estos usos deben contar con prescripción y control del facultativo.

Uso en Pediatría y Geriatría: **Gingivit[®] NF** puede ser usado en niños siempre que exista una indicación específica y se cuente con vigilancia y control del facultativo. Su uso en pacientes geriátricos tiene las mismas indicaciones que en adultos y no requiere modificaciones o ajustes en la forma de uso.

Precaución para conducir vehículos y maquinarias: No se requieren precauciones especiales para conducir vehículos o maquinarias mientras se usa **Gingivit[®] NF**.

Tratamiento en caso de Sobredosis: No se han reportado casos.

Dosis y Vía de Administración:

DOSIS: 2 gramos 3 veces al día.

Vía Tópica-Dental.

Condiciones de Almacenamiento: Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

Elaborado por: Laboratorio Farmacéutico Lamosan Cía. Ltda. Dirección: Urb. John F. Kennedy, Calle Paseo Del Sol S6-574 y De Los Luceros. Pusuquí. Quito - Ecuador. F.R.: Dr. Antonio Moral.

Reg. San. Ecuador N°: 2687-MEN-0620

www.lamosan.com.ec



LAMOSAN
LABORATORIO FARMACÉUTICO